



Estudio de la frecuencia de los factores de riesgo asociados a los desgarros perineales en pacientes atendidas en el Hospital Materno Neonatal de Posadas, Misiones. Periodo de julio a diciembre 2019



A corto plazo

- Estrés postraumático
- Depresión
- Ansiedad
- Mala percepción de la imagen corporal
- Vergüenza
- Rechazo/miedo a futuros embarazos.

Daño Psíquico

Fistulas

Disfunción sexual

Desgarros perineales

Son la pérdida de continuidad que se produce en las partes blandas del canal del parto a consecuencia del pasaje del feto

Una de las primeras tres causas más frecuentes de hemorragia posparto.

Causa de importante morbilidad física y psíquica.




Factores de riesgo





Problemática



Factores Maternos

- Edad Materna
- Presencia de anemia materna
- Grado de anemia
- Preparación para el parto

Factores Obstetricos


- Desgarros perineales
- Paridad
- Uso de episiotomía

Factores neonatales

- Peso del recién nacido



PIM n (%)



■ SI ■ NO

(%)


- Leve
- Moderada
- No presenta




Factores Obstétricos

Episiotomía n (%)

- SI
- NO



Gra




- Primipara
- Multipara
- Gran multipara



Factor Neonatal

Peso del Recien nacido n (%)



Muy bajo peso:

1000gr-1499gr

Bajo peso:

1500gr-2499gr

Normopeso:

2500gr-3999gr


Macrosomico:

4000gr o mas.



En este estudio...





Recomendaciones propuestas



Motivación
PIM

GRACIAS.



Registro minucioso de
datos



Considerar otros tipos
de variables.

